



**Calibrachoa NOA** (12 cm/ 6 inches)

	pH	Ec	Min Temp F	Max Temp F	Min TEMP C	Max TEMP C	Kneifen	Füttern	Licht	PGR	Fungizid	Kommentare
Wurzelbildung												
Woche 1 haftende Einlage	5,2 bis 5,8	0,80	72	74	22	23		50 ppm N im Nebel	Ergänzende Beleuchtung	B-9 3750 ppm Tag nach stechen	Daconil Tag des Stechens	Füttern im Nebel kann helfen. B-9 beim Stechen kann auch helfen
Woche 2	5,2 bis 5,8	,80 bis ,90	72	74	22	23		50 ppm N im Nebel	Ergänzende Beleuchtung kann nutzen	B-9 5000 / Arest 10 ppm Tankmischung	Zweite Anwendung Daconil	
Woche 3	5,2 bis 5,8	,90 bis 1,0	Abkühlen auf 68 F wenn verwurzelt	68	Abkühlen auf 20 C wenn verwurzelt	20	In dieser Woche Kneifen. Mindestens 2 Knoten lassen	150 ppm füttern, um Verzweigung zu fördern	Ergänzende Beleuchtung kann nutzen	B-9 5000 / Arest 10 ppm Tankmischung wenn erforderlich	Drench Banrot	B-9 Arest wenn erforderlich
Woche 4	5,2 bis 5,8	,90 bis 1,0	62	68	17	20		100 bis 150 ppm füttern	Ergänzende Beleuchtung kann nutzen	B-9 5000 / Arest 10 ppm Tankmischung wenn erforderlich		
Woche 5 Umpflanzung	5,2 bis 5,8	1,0 bis 1,2	62	68	17	20		100 bis 150 ppm füttern	Ergänzende Beleuchtung kann nutzen	1 ppm Bonzi in der Einlage tränken in der Woche vor der Umpflanzung	Daconil oder Spectro nach Umpflanzung sprühen	

