


# CHÉRIE™

Dahlia variabilis

Nouveau  
2025



NEW 25



- Les grandes fleurs doubles sont disponibles en version unie ou bicolore.
- Contenant de 14cm minimum
- Cette série se caractérise par une vigueur, une taille des fleurs et une réaction des fleurs uniformes.
- La taille adulte est de 25-30 cm de hauteur x 30-41 cm de largeur.

CHÉRIE™  
Red Lace

Variétés dans la série Chérie™ :



NEW 25

CHÉRIE™  
Purple



NEW 25

CHÉRIE™  
Radiant Rose



NEW 25

CHÉRIE™  
Yellow



NEW 25

CHÉRIE™  
Lemon



NEW 25

CHÉRIE™  
Peach



NEW 25

CHÉRIE™  
Pink Lace



NEW 25

CHÉRIE™  
Pink Tutu



NEW 25

CHÉRIE™  
Abstract Raspberry



NEW 25

CHÉRIE™  
Red Flare



NEW 25

CHÉRIE™  
Vintage Orange



NEW 25

CHÉRIE™  
Vanilla



NEW 25

CHÉRIE™  
White



NEW 25

CHÉRIE™  
Red



NEW 25

CHÉRIE™  
Deep Red



NEW 25

CHÉRIE™  
Abstract Purple

Pour des informations supplémentaires sur la culture technique:

CHÉRIE™ [CLIQUEZ ICI](#)



 DANZIGER

[www.danzigeronline.com](http://www.danzigeronline.com) |   

# CHÉRIE™

Dahlia variabilis

Nouveau  
2025

## CONSEILS DE MULTIPLICATION

- Piquer en priorité – Numéro 2 sur 4 catégories



Période de floraison

Printemps / Été  
Floraison



Largeur

(12 - 16")  
30 - 41 cm



Hauteur

(10 - 14")  
25 - 35 cm

Temps moyen	Température	Hormone	Fertilisation	Fongicide
4 semaines	Semaines 1 - 2 21° - 22 °C	Facultatif	Semaines 1-2 50 ppm N	Pulvériser un fongicide pour lutter contre Le Botrytis et les bactéries le jour du piquage
	Semaines 3 - 5 18° - 20 °C		Semaines 3 - 4 100 à 125 ppm	Jour du piquage et semaine 2



**Spécifications de l'irrigation** - Retirer la brumisation dès que possible (jour 2 ou 3).

- Appliquer un fongicide à large spectre le jour de du repiquage pour lutter contre les maladies foliaires, y compris l'oïdium.
- Un mouvement d'air adéquat est nécessaire pour contrôler les maladies pendant la production.
- Interruption nocturne de 22 heures à 2 heures du matin ou prolongation de la durée du jour de 24 heures jour commencé jour de piquage au moins 10 pieds-bougies, cette opération doit être effectuée pendant toute la durée de vie du jeune plant/de la plantule 2 semaines de plus pour les grands pots de 10 pouces ou plus.



Enracinement	pH	EC	Temp	Engrais	Eclairage	Régulateur	Fongicide	Commentaires
Semaine 1	5,8 / 6,2	0,80	22° / 23° C	50 ppm N en brumisation			Jour du piquage	
Semaine 2	5,8 à 6,2	0,80 à 0,90	22° / 23° C	50 ppm N en brumisation			Seconde application fongicide	
Semaine 3	5,8 à 6,2	0,90 à 1,0	Refroidir à 21° - 20 °C	Engrais 100 ppm à 150 ppm		Daminozide selon les besoins à 1500 ppm		
Semaine 4	5,8 à 6,2	1,0 à 1,2	18° à 20 °C	engrais 100 jusqu'à 150 ppm				

Pour des informations supplémentaires sur la culture technique:

CHÉRIE™ [CLIQUEZ ICI](#)



 **DANZIGER**

[www.danzigeronline.com](http://www.danzigeronline.com) | 

# CHÉRIE™

Dahlia variabilis

Nouveau  
2025



## CONSEILS DE FINITIONS

- Une pincement est nécessaire, éventuellement deux pincement pour les grands récipients.
- Début 14 heures jours après la transplantation – journée prolongée

Temps moyen (à partir de plantules)	Température	Retaille/ Modification de la longueur du jour	Fertilisation	Régulateur de croissance
6 à 8 semaines	Temps moyen	De longues journées sont nécessaires pour une floraison uniforme	150 - 200 ppm N  EC du sol 1,0 - 1,2 pH 5,8 à 6,2	Daminozide si nécessaire
12 cm pot	19 ° - 22 °C			
7 à 9 semaines	1 ppm			
15 cm				
8 à 10 semaines		Prolonger la journée jusqu'à 14 heures		
18 cm	1 ppm			
<b>Nuisibles</b>	Aphids	ACETAMIPRID, FLONICAMID, IMIDACLOPRID, DICHLORVOS		
	Thrips	METHIOCARB, ACRINATHRIN, ABAMECTIN, DICHLORVOS, SPINOSAD		
<b>Maladies</b>	Botrytis	CYPRODINIL+FLUDIOXONIL, IPRODIONE, POLYOXIN		
	Pythium	PROPAMOCARB		
	Phytophthora	PROPAMOCARB		



- Pulvériser pour contrôler l'oïdium après la transplantation
- Régulateur:- Pulvériser du Daminozide à 750 ppm en 2 applications sur les jeunes plants en cours de maturation..
- Dépister les pucerons, les thrips, les tétranyques et les mineures des feuilles

Finitions	pH	EC	Temp	Engrais	Eclairage	Régulateur	Fongicide	Commentaires
<b>Semaine 5 Transplantation</b>	5,8 à 6,2	1,0 à 1,2	18 ° à 20 °C	engrais 100 jusqu'à 150 ppm	Nécessaire	Daminozide si nécessaire	Pulvériser un fongicide après transplantation	
<b>Semaine 6 à 10</b>	5,8 à 6,2	1,0 à 1,2	18 ° à 20 °C	engrais 100 jusqu'à 150 ppm	Nécessaire		Inclure la lutte contre l'oïdium	

Pour des informations supplémentaires sur la culture technique:

CHÉRIE™ [CLIQUEZ ICI](#)

